

Prestop® - ett biologiskt bekämpningsmedel

Användningsområde: plantodling, grönsaker, örter och prydnadsväxter

- Bekämpar groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av [Pythium](#), [Phytophthora](#), [Rhizoctonia](#) och [Fusarium](#)
- Bekämpar svartprickröta på gurka ([Didymella](#)) och gråmögel ([Botrytis](#)) på tomat, paprika, gurka, jordgubbe, prydnadsväxter och småplantor
- Kan spridas via droppbevattning, genom besprutning, bevattning eller genom att blandas i växtunderlaget
- Innehåller sporer och mycel av svampen [Gliocladium catenulatum J1446](#)
- Förpackning 100 g och 1 kg

Mot groddbrand och rotsjukdomar hos grönsaker, prydnads-växter och örter: Blandas i växtunderlaget före sådd (200-500 g/m³) eller bevattnas efter sådd (50-100 g/10 m²). Behandla plantorna i planteringsskedet via droppbevattningen (100 g/400-500 växter) och upprepa månatligen.

Bekämpning av svartprickröta hos växthusgurka och gråmögel hos tomat, paprika och gurka: Bespruta stammen, i synnerhet stambasen när det gäller svartprickröta, med 0,5% Prestop -vattenlösning genast efter planteringen. Upprepa med 3-4 veckors mellanrum.

Bekämpning av gråmögel hos prydnadsväxter och småplantor: Bespruta eller doppa sticklingarna i stickningsskedet (0,5% Prestop-vattenlösning). Bespruta småplantorna efter plantuppkomsten och upprepa vid behov efter en månad.

Prestop® Mix - ett biologiskt bekämpningsmedel

Användningsområde: plantodling, bekämpning av gråmögel på jordgubbe och hallon

- Bekämpar effektivt groddbränna och rotsjukdomar som orsakas av [Pythium](#)- och [Rhizoctonia](#) -svampar
- Särskilt lämpligt för organiska växtunderlag, såsom torvblandningar
- Sprids genom bevattning eller inblandning i växtunderlaget
- För bekämpning av gråmögel (*Botrytis*) på jordgubbe och hallon, sprids med hjälp av bin
- Innehåller mycel och sporer av svampen [Gliocladium catenulatum J1446](#)
- Lämpar sig för integrerat och biologiskt växtskydd. Godkänt för ekologisk produktion.
- Förpackningar 400 g och 1 kg

Jordgubbe och hallon: I bekämpning av gråmögel (*Botrytis*) på jordgubbe och hallon sprids med hjälp av bin under blomningen. Utplacera två med spridningsanordning försedda bikupor per hektar. Tillsätt Prestop Mix -pulver i spridningsanordningarna 5-10 g per dag under hela blomningstiden. Mikropulver fastnar i binas behåring då de rör sig genom spridningsanordningen. Den sammanlagda åtgången är 300 -500 g/ha.

Grönsaker: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband med planteringen (10 g/m²)

Sallat och örter: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband med sådden (10 g/m²)

Utplanterings- och krukväxter: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband med sådden (10 g/m²). Behandlingen upprepas vid planteringen (t.ex. för 9-10 cm krukor 250g/1000 växter)

Snittblommor: Blanda i växtunderlaget (50 g/100 l torv) eller vattna i samband med planteringen (10 g/m²)